

ISTRUZIONI POST OPERATORIE – Levigatura radicolare

Per diminuire il disagio e raggiungere una pronta guarigione a seguito di una seduta di igiene profonda, osservare le seguenti indicazioni.

Cosa può avvenire in seguito a tale intervento:

- **Sanguinamento:** in seguito all'accumulo di sangue nella saliva, questa può assumere un colorito rossastro. Ciò è normale e può continuare a verificarsi, successivamente all'intervento, per il resto della giornata.
- **Dolore:** Nel momento in cui cessa l'effetto dell'anestesia, si può riscontrare un lieve disagio nell'area interessata e protrarsi per i giorni successivi.
- **Gonfiore:** un modesto gonfiore delle gengive, localizzato a uno o più denti, può manifestarsi a seguito dell'intervento e persistere per alcuni giorni.
- **Febbre:** occasionalmente può verificarsi una lieve alterazione della temperatura. L'assunzione di farmaci antifebbrili (es. Tachipirina) può essere consigliato.
- **Sensibilità:** i denti possono sembrare poco stabili ed essere sensibili alle basse o alte temperature. Il fenomeno, peraltro normale dopo questo tipo di trattamento, si risolve nell'arco di 2-4 settimane.

Cosa fare a seguito dell'intervento:

- Dopo la seduta, assumere un analgesico prima che l'anestesia cessi completamente il suo effetto. Se necessario, continuare a prendere una compressa ogni 8-12 ore per i successivi 2 giorni.
- Risciacquare con collutorio due o tre volte per i 20 giorni successivi.
- Utilizzare uno spazzolino con setole morbide o medie almeno due volte al giorno, in modo delicato ma attento. Durante lo spazzolamento, può verificarsi un leggero sanguinamento, segno che i tessuti stanno cominciando a guarire.
- Evitare condimenti pesanti e piccanti e cibi duri e croccanti per alcuni giorni.
- Essendo i tessuti in stato di guarigione, in caso di sensibilità al caldo ed al freddo, utilizzare un dentifricio per denti sensibili o del gel al fluoro frequentemente (almeno 2 volte al giorno) per 1/2 settimane. Più i denti sono puliti, minore sarà il grado di sensibilità avvertito.
- Utilizzare scrupolosamente ogni altro prodotto prescritto (filo interdentale, scovolino, collutorio).
- Astenersi dal fumo per 24 ore o più, in quanto interferisce con il processo di guarigione.
- Per qualsiasi dubbio, contattare lo Studio.

Contattare lo Studio qualora riscontriate:

- Dolore persistente, sanguinamento eccessivo, febbre alta, gonfiore notevole a seguito dell'intervento, reazione ai medicinali quali violente eruzioni cutanee, prurito e problemi di respirazione.

Seguire attentamente queste indicazioni aiuta notevolmente nel processo di guarigione dell'area interessata. Non osservarle, al contrario, può causare disagi e limitare l'esito positivo dell'intervento.