

ISTRUZIONI POST-TRATTAMENTO ENDODONTICO

La terapia canalare richiede uno o più appuntamenti in base alle condizioni iniziali del dente ed alla gravità dell'infezione.

All'inizio del trattamento il dentista isola il dente da trattare mediante la diga di gomma per prevenire la contaminazione salivare dei canali e proteggerla dalle sostanze e dai materiali impiegati durante questo tipo di cura.

Al termine della seduta viene applicata un'otturazione provvisoria sul dente per proteggerlo fra un appuntamento e l'altro. È possibile che questa si consumi o si scheggi durante la masticazione nei giorni successivi e che Lei avverta uno strano sapore: se ciò dovesse accadere, non esiti a contattarci telefonicamente.

Qualora venga utilizzato un anestetico, le labbra, i denti e/o la lingua possono formicolare anche fino a qualche ora dopo l'appuntamento. Eviti di masticare finché l'effetto dell'anestesia non sia scomparso.

Se il dente era privo di sintomi all'inizio della cura, è improbabile che compaiano particolari fastidi dopo una terapia canalare. Ma, qualora il dente manifestasse iniziale dolore o gonfiore già prima della terapia, è necessario qualche giorno prima di avere una completa remissione dei sintomi ed è possibile avvertire una dolenzia fra una seduta e l'altra, soprattutto durante la masticazione.

Dal momento che il dente è più fragile dopo una cura canalare, eviti di masticare da quella parte della bocca e di assumere cibi duri o molto appiccicosi, fino all'esecuzione del restauro permanente.

Una ricostruzione definitiva, soprattutto mediante corona, proteggerà in futuro il dente da eventuali fratture.

Per ogni altro dubbio o problema, lo Studio è a Sua disposizione ai contatti indicati di seguito.